

# QUE FAIRE AU JARDIN EN MAI ?

## Les arbres, arbustes et arbrisseaux

Taillez les arbustes à floraison printanière une fois les plantes défleuries. Attention, ne pas tailler en présence de nids d'oiseau. Il faudra attendre alors début août pour le faire.

Les déchets de tailles sont broyés au broyeur ou déchiquetés à la tondeuse thermique ; ils servent de paillis nourriciers et protecteurs.

**Ne rien faire pour les arbustes à floraison estivale.** Leur taille sera prévue entre octobre et mars prochains.

### Quelques conseils pour protéger les arbres et arbustes !

- Observez les rameaux car les pucerons peuvent attaquer les premières pousses. En présence d'auxiliaires (adultes et larves de coccinelles, larves de chrysopes...), ne faites rien. Toutefois, en l'absence d'auxiliaires, pulvérisez le soir une infusion de plantes aromatiques (menthe, mélisse citronnelle, sauge, lavande...), une macération froide de feuilles de rhubarbe ou du savon noir. Cette action est insectifuge.

### Infos du mois : la taille des arbustes

#### Le forsythia

Cet arbuste à fleurs jaunes a une floraison abondante sur bois de 1 à 2 ans. S'il est conduit librement en touffe, la taille se limite, les premières années, à un nettoyage en supprimant les grandes tiges malingres ou mal placées. L'arbuste est ainsi bien aéré et son développement est harmonieux.

Pour les années qui suivent, il suffit de tailler les extrémités des rameaux tous les 2 ans afin de provoquer des ramifications latérales et de supprimer les vieilles branches. En éliminant ces dernières, vous évitez le dégarnissement de la base. Si le Forsythia est conduit en haie taillée, il est important de le tailler en juillet. Sa floraison est toutefois moins abondante qu'en forme libre. Important : si le forsythia est dégarni suite à une taille au carré, à une densité trop forte de plantes ou à une non-taille, pratiquez un recépage en coupant à ras à 20 cm l'ensemble des branches, en mai ou en hiver. Le résultat sera surprenant et les arbustes prendront un coup de jeune.



#### Le lilas

La taille des lilas est controversée !

Taillez, après la floraison, juste au-dessus d'un rameau latéral qui joue le rôle de tire-sève.



#### Le groseiller à fleurs

Coupez les branches les plus âgées de façon à favoriser l'émission de nouveaux rejets. Taillez aussi celles qui retombent juste au-dessus d'une pousse verticale bien vigoureuse.



## Arbres fruitiers et petits fruits

- Ne faites rien sur les arbres encore en fleurs ! Par contre, pour les autres, vous pouvez éliminer rapidement les branches malades ou mortes ; elles sont facilement identifiables.
- Ne plantez pas d'arbres fruitiers ou de petits fruits. Attendez plutôt l'automne pour toute plantation !



Complétez les paillis en place avec les déchets verts du moments (tontes de pelouse, broyat de déchets de taille, etc.). Ceux des plates-bandes des fraisiers le sont avec des aiguilles de pins ou de sapins. Si vous achetez du paillis, mieux vaut du miscanthus que de la paille souvent traitée en agriculture conventionnelle.



MISCANTHUS

Pour en savoir + sur la taille et la plantation des arbres fruitiers et des petits fruits : "[Dossier plantation et taille des arbres fruitiers et des fruits](#)" sur la page du Club.

### Quelques conseils pour protéger son verger et ses petits fruits !

Poursuivez l'installation des bandes engluées à mi-hauteur autour des troncs ou à la base des premières charpentières si le tronc est couvert de lierre. Elles piégeront les fourmis, éleveuses de pucerons. Attention, mettez très peu de glu.

Supprimez manuellement les feuilles des fruitiers ayant un feutrage blanc (oïdium). Pour prévenir l'attaque de maladies (oïdium, tavelure...) et une fois les différentes floraisons passées, vous pouvez pulvériser les arbres avec une décoction de prêle (dilution à 20%) ou avec une préparation prête à l'emploi.



OÏDIUM DE LA VIGNE

En présence de chenilles défoliatrices (Cheimatobies...), pulvériser avec du Bacille de Thuringe (BT). Attention à ne pulvériser que les plantes attaquées ; sinon il détruit les autres chenilles non prédatrices au jardin.


Limitez les invasions de pucerons grâce à des pulvérisations d'infusions de mélisse ou de sauge (sans dilution), des macérations froides de feuilles de rhubarbe (sans dilution), ou de savon noir.

# Au potager

Comme cela vous était présenté depuis plusieurs années par Eric CHARTON, nous vous proposons d'organiser votre potager en 4 grands espaces thématiques. Le choix des légumes ou des légumes-fruits suit une logique gastronomique, tout en alliant le compagnonnage entre les différentes espèces cultivées.

- **L'espace "Ratatouille"** : tomates, poivrons, aubergines, courgettes, piments, plantes aromatiques, ail, oignons et échalotes.
- **L'espace "Potée"** : carottes, poireaux, céleris, panais, navets, choux, concombres, cornichons, crosnes et topinambours pour donner du volume.
- **L'espace "Plat gros volumes"** : pommes de terre, haricots verts nains et à rames, petits pois nains et à rames et fèves.
- **L'espace "Soupe de courges"** : toute la famille des Cucurbitacées sauf courgettes et concombres.
- Les salades, les radis, les blettes, les betteraves de différentes couleurs ou les navets ... occupent les parties libres ou libérées des différents espaces.

Chaque année, vous déplacerez chacune de vos planches sur la planche suivante de gauche à droite : par exemple, l'espace "Plats gros volumes" prendra la place de l'espace "Ratatouille" en année N+1 etc.



**Légende :** Cultures en place (bleu foncé) | Travaux du mois (rouge) | Zones en paillis (vert)

PLAN D'IMPLANTATION DU POTAGER - ERIC CHARTON

## Espace "Plats gros volumes"

C'est encore la bonne période pour semer les fèves, les petit-pois ou les pois. Après un décompactage du sol, les fèves sont semées tous les 10 cm sur le rang et tous les 40 cm entre. Les petit-pois le sont en ligne (une graine tous les 3 cm) ou en poquets. Le grillage utilisé comme support peut être remplacé par des branchages issus des tailles d'arbustes à floraison estivale ou d'élagages.

Les petit-pois nains ne demandent aucun support. Comme les graines sont très grosses, un paillis de 1 à 2 cm n'entrave pas la germination.



- Buttez les petits pois ou les pois. Il est encore possible d'en semer en espérant qu'il ne fasse pas trop chaud à la récolte.

- Les trois premières semaines de mai, planter les pommes de terre. Faites une tranchée de 15cm de profondeur. Un tubercule est déposé tous les 30 à 40 cm. Une distance de 40 à 70 cm en fonction des variétés est nécessaire entre les rangs.

- Semez les haricots nains. Les graines de haricots nains demandent un sol bien réchauffé pour germer (sinon ils pourrissent rapidement surtout si le sol est mouillé). Prévoyez un semis tous les 15 jours jusqu'au 15 août 2021. L'idéal est de faire une tranchée puis de semer les haricots en ligne ou en poquet. Les graines sont recouvertes légèrement de terre pour que le soleil les réchauffe. Une fois les pieds bien développés, ils sont buttés une à deux fois.

- Semez les haricots à rame. En installant plusieurs piquets de 2,5 à 3 m (tipi, épouvantail...), vous pouvez semer en poquet des haricots à rames. 2 à 3 mois sont nécessaires avant leur récolte. Certaines variétés sont dites "Mangetout", d'autres sont à écosser.



TIPI POUR HARICOTS GRIMPANTS

- Pour occuper les plates-bandes vides, repiquez les salades tous les 30 cm et dans un sol bien décompacté.



- Semez les salades pour un repiquage ultérieur. Les graines sont semées de préférence en pleine terre et sous abri (jusqu'à mi-avril) sur un sol bien ameubli, en large barquette ou sur plaque de semis. En vue de limiter la future corvée de l'éclaircissage, le semis doit être le plus clair possible. Mélangez aux graines de salade des semences de radis, du marc de café ou du sable, puis recouvrez à peine les graines de terreau.

### Espace "Ratatouille"

- Faire un léger décompactage entre les rangs d'ail, d'oignon ou d'échalote repiqués de mars à avril. Attention, à ne pas blesser les bulbes. Les plantes indésirables sont arrachées puis sont laissées sur place.

- Attention au liseron qui s'enroule autour des tiges et qui risquent de les casser.

- Evitez de déposer du paillage épais entre sur le rang : une grande humidité engendre la pourriture des bulbes dans les sols frais.



LISERON DES HAIES

- Jusqu'à mi-juin, plantez les tomates profondément en pleine terre ou sous abri (tunnel ou tonnelle). Les distances de plantation entre les tomates sont de 60/80 cm sur et entre les rangs. Le trou de plantation doit être large et profond d'un fer de bêche.

La terre est mélangée à du compost ou du terreau de plantation. Un tuteur droit, torsadé (queue de cochon) ou un simple fil convient (sous abri). Un paillage épais est épandu avec un mélange des déchets verts du moment (tontes de pelouse, broyat de déchets de taille, feuilles mortes). De la paille ou du foin complète cette production in situ.



### Important

Les plants de tomates sont souvent hauts, filiformes et jaunes suite à leur obtention par manque de lumière, dans un godet de faible volume ou dans un substrat inapproprié. Les pieds sont alors plantés la motte à plat et assez profond afin de favoriser l'émission de nouvelles racines sur la tige enterrée.



PLANTATION DES TOMATES - COMPTOIR DES JARDINIERS

- Plantez les pieds de tomates- cerises tous les 2m le long d'un grillage haut de plus d'1m. Chaque nouvelle pousse donne une grappe ; rien n'est coupé (ce ne sont pas des gourmands) mais elle est attachée. Ces conseils sont valables pour les variétés dites "groseilles", "poires" ou "mirabelles".

- Repiquez les pieds d'aubergine, de poivron ou de piment à 60/80 cm sur et entre les rangs. Tuteurez les pour éviter la casse en fin de période de production.



- Plantez les courgettes non coureuses, issues des semis en godets ou achetées, tous les mètres sur et entre les rangs. Les semis se poursuivent en mai puis en juin afin d'avoir de jeunes pieds producteurs de petites courgettes.

- Après avoir dégagé le paillis, semez sur l'entre-rang des légumes à pousse rapide comme les radis roses ou les navets récoltés jeunes ou repiquez des salades.



## Espace "Potée"

- Repiquez les choux pommés (de Milan, Quintal, rouge...) à feuilles ou à fleurs (chou-fleur, brocoli, Romanesco) achetés en mini-mottes ou maison tous les 50 cm entre et sur le rang. Les différentes variétés de choux-raves (vertes, rouges...) le sont tous les 30 cm. En pépinière, semez toutes les variétés de choux à repiquer en pleine terre. Vous pouvez aussi le faire en godets de récupération ou sur planches de semis.

- Repiquez un premier rang de poireaux pour une consommation en été.

- Semez clair les carottes en rangs séparés de 30 cm. L'éclaircissage se fait à 5 cm puis à 10 cm. Vous pouvez encore semer des panais.



- De mai à juin, repiquez en motte les céleris-raves et les céleris-branches à 30/40 cm sur et entre les rangs. Une terre enrichie en compost mûr est nécessaire car ce légume-racine est très gourmand en nutriments. Un paillage épais de plus de 5 cm est obligatoire.

- Semez des betteraves rouges (Crapaudine, Noire d'Egypte...) et des navets (Navet blanc...) ou repiquez des laitues de printemps. Ces semis ou plantations permettent d'occuper les places libres ou libérées de l'espace "Potée".

- Repiquez fin mai les concombres semés en godets en avril. Le faire tous les mètres dans une terre riche en matière organique. Leur palissage sur un grillage haut d'1 à 1,60 m favorise leur développement.

- Plantez des plantes aromatiques en godets et semez le basilic en place ou en godets.

## Espace "Soupe de courges"

- Après les Saints de glace, repiquez les différentes espèces de courges (butternut, citrouille, longue de Nice, potimarron, potiron, spaghetti, turban turc...) en respectant les distances de plantation (de 1 à 2 m selon les variétés) et en complétant les paillis avec les déchets du moment (tontes de pelouse, broyat de déchets de taille...).



### Conseils pour protéger cet espace !

Ces légumes-fruits sont protégés des limaces en mettant un pot percé autour et dépassant du sol de 3 à 5 cm. 5 à 8 granulés d'anti-limaces autorisés en Agriculture biologique (Ferramol) sont déposés à l'intérieur.



En cas de campagnols (rats-taupiers), le fond du pot percé est tapissé d'un filet.

En période très chaude, les feuilles des courges sont sensibles au blanc (oïdium). Pour prévenir ces attaques, vous pouvez pulvériser toutes les semaines et le soir avec un mélange d'eau et de lait (ou petit-lait).

Pour éviter que la buse soit bouchée, il est important de bien nettoyer le pulvérisateur après chaque utilisation !